






Protezione delle mani - Rischio biologico	<p>Per questo tipo di rischio le mani devono essere protette con guanti a perdere, quando ci sia una potenziale esposizione a rischio biologico: sangue, feci, urina e qualsiasi materiale organico. Il rischio potenziale e' sempre presente e diventa particolarmente rilevante in questa fase.</p> <p>Un paio di guanti deve essere tenuto sempre in tasca: collaboratori scolastici, insegnanti ed educatori, in particolare nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido. Anche le persone che assistono disabili si possono trovare in questa situazione.</p>			
	<p>Dopo l'uso i guanti devono essere sfilati con cura evitando qualsiasi contatto della pelle con la parte esterna potenzialmente contaminata (questa parte dovrà essere toccata solo dalle mani guantate) e gettati in un cestino dei rifiuti.</p> <p>A questo punto igienizzerà le mani con il lavaggio o in alternativa utilizzerà un gel alcolico. Quindi preleverà un nuovo paio di guanti da tenere in tasca.</p>			
Protezione delle mani - Rischio chimico	<p>Quando ci sia il rischio di contatto delle mani con agenti chimici, detersivi, devono essere usati dei guanti per la pulizia EN 420/EN 374. Prima di indossare i guanti l'operatore igienizzerà le mani e lo stesso farà quando se li toglierà dopo averli usati.</p> <p>In questa fase l'operatore eviterà di toccare con la pelle la parte esterna dei guanti.</p>			

	I guanti non monouso dovranno dati in dotazione all'operatore e non dovranno essere scambiati con i colleghi.			
	Dovranno essere sostituiti periodicamente e ogni qualvolta risultino danneggiati.			
Protezione delle vie respiratorie	Quando non sia possibile mantenere la distanza fra le persone deve essere indossata la mascherina chirurgica o una mascherina equivalente curando che siano correttamente coperti naso e bocca. Le mascherine devono essere periodicamente sostituite o lavate.			
	Nel caso ci sia una potenziale esposizione nei confronti di persone a rischio o potenzialmente a rischio: persone a cui deve essere misurata la temperatura o che abbiano una temperatura superiore a 37.5 C, deve essere indossato uno schermo di protezione, oltre alla mascherina. Al termine dell'uso lo schermo deve essere igienizzato con soluzione di ipoclorito di sodio o alcolica.			
Uso di mascherine FFP3	E' opportuno che sia tenuto a disposizione un numero limitato di mascherine FFP3 da utilizzare quando sia necessario: in ambienti che potrebbero essere contaminati da vapori o aerosol.			
Uso di mascherine FFP2	Quando sia stato prescritto sul soggetto specifico.			

Altri DPI	In questo foglio abbiamo considerato i DPI di protezione contro il rischio biologico e un limitato rischio chimico (quali detergenti). Non sono considerati i DPI per rischio chimico significativo, (esposizione a sostanze chimiche di rischio piu' elevato), di protezione da rumore, vibrazioni, taglio, ecc.			
-----------	---	--	--	--